







QX315 .H328 outlas v.4



Calamintha alpina (L.) Lam. — Alpen-Bergminze.

Alpenkette, trockene Stellen, 1800 M. bes. auf Kalk. Mai-September





Hormium Pyrenaicum L. — Pyrenäisches Drachenmaul. Schweiz bis Krain und Steiermark, Wiesen, 1200—2000 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





Dracocephalum Ruyschianum L. — Ruisch's Drachenkopf. Schweiz und Tirol, Wiesen, bei 1600 M. Juni, Juli.




Stachys alpina L. — Alpen - Ziest. Alpenkette, Gebüsch, bis 1500 M., Juli, August.

opl






Betonica Alapedurus L. ruchsschwanz-Betonie, Alpenbette, track e Stellen, to a 172 Maraf K. P., Jean-August






Ajuga pyramidalis L. — Pyramidaler Günsel. Alpenkette, Wiesen, 1300-2000 M. bes. auf Urgestein. Juli, August





Pinguicula flavescens Flörke — alpina aut. nec. L. — Gelbliches Fettkraut


Alpenkette, auf Sumpfboden, 800-2200 M. April-Juni.






Pinguicula vulgaris L. — Gemeines Fettkraut.

Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1600 M., Mal-Juli.













Androsace Hausmanni Leyb. — Hausmann's Mannsschild.

Südalpen, auf Dolomit, zerstr., 2500—2700 M. Juli, August.






Androsace glacialis Hoppe. — Gletscher-Mannsschild. Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 2000—2700 M., auf Urgestein, Juli, August.





Androsace lactea L. — Milchweisser Mannsschild.


Albenkette, auf Kalkboden, 1520—2400 M. Juni, Juli.






Androsace carnea L. — Fleischrother Mannsschild.

Alpen der Schweiz und Südtirols, auf Urgestein, 2300 M. Mai-Juli










Androsace villosa L. — Zottiger Mannsschild. Steiermark und Krain, trockene Stellen, bei 2000 M., Juli, August.






Androsace Chamaejasme Host. — Zwergiger Mannsschild.

Alpenkette, Felsen, 1500 - 2500 M. Juni - August.








Men of the Mill Michel Golf at the





Primula farinosa L. – Mehliger Himmelsschlüssel.

Alpenkette, auf Moorboden, 330–2500 M. Mai-Juli.





Primula longiflora L. — Langblumiger Himmelsschlüssel. Schweiz bis Ober-Oesterreich, Wiesen, 1600-2000 M. auf Urgestein. Juni, Juli.





Primula Auricula L. — Aurikel, Himmelsschlüssel. Alpenkette, auf Kalkgerölle, 1000—2,000 M. April—Mai.





Primula Carniolica Jacq. — Krainischer Himmelsschlüssel. Krain, trockene Stellen, bei 1500 M. Mai, Juni.





Primula pubescens Jacq. = Rhaetica Gaud. nec Koch = Helvetica Don., Schleich. = super Auricula × hirsuta — Flaumhaariger Himmelsschlüssel.

Tirol, bis 1800 M., Mai, Juni.





Primula glutinosa L. — Klebriger Himmelsschlüssel, blauer Speik.
Schweiz bis Steiermark, 2000—2800 M. auf Urgestein. Juli, August





1511-



Primula spectabilis Tratt. — Ansehnlicher Himmelsschlüssel. Südtirol bis Oesterreich und Krain. Wiesen, 1600–2100 M., auf Kalk, Juni-August.





Primula Clusiana Tausch. = spectabilis Koch nec Tratt. -- Clusius Himmelsschlüssel.

Ostalpen bis zum Innflusse, auf Kulkboden, 1200-2200 M. Mai-Juli.





Primula Tiroliensis (Schott.) = Allionii Koch et aut. nec Lois. Tirolischer Himmelsschlüssel.
Südl. Tirol, auf Dolomit. Mai-Juni.





Primula viscosa All. (1785) = latifolia Koch nec Lap = graveolens Hegetschw. = hirsuta Vill. nec All. — Klebriger Himmelsschlüssel.

Südl. Schweiz, bes: Engadin, bei 1800 M., Juni - August.





Primula villosa. Wulf. — Zottiger Himmelsschlüssei.

Steiermark bis Krain, auf Urgestein. Mai. Juni.





Primula hirsuta All. (1785) = villosa Koch et aut nec Jacq.; viscosa Vill. nec All. — Rauhhaariger Himmelsschlüssel.


Schweiz und Tirol, Wiesen, 1300-2100 M. Juni-Juli.





Primula Oenensis Thom. i. sched. = Daonensis Leyb. 1854. Inn-Himmelsschlüssel.

Schweiz, südlich und westlich Tirol, Wiesen, trockene Stellen, 2000 - 2700 M., auf Urgestein, Juni, Juli.






Cortusa Matthioli L. — Matthioli's Cortuse, Heilglöckchen. Schweiz bis Steiermark, auf Triften und unter Gebüsch, 900-1700 M. Juni-August.






Soldanella alpina L. — Gemeines Alpenglöckchen Alpenkette, bes. auf Schneefeldern, 1300-2500 M. Mai, Juni.









Cyclamen europaeum L. - Europäische Erdscheibe. Alpenkette, Gebusch, bis 18. August. October





Globularia cordifolia L. — Herzblättrige Kugelblume. Kalkalpenkette, trockene Stellen, 1300-2300 M. Juni - August.





Globularia nudicaulis L. — Naktstengelige Kugelblume.

Aba i ette, bes. auf Kalkboden, 1000 - 2000 M. Juni - August.



Armeria alpina (Hoppe) Willd. — Alpen-Grasnejke. . . Schweiz bis Oesterreich und Steiermark, trockene Stellen, 1500 2300 M auf Kaik. Juni August.





Plantago alpina L. — Alpen-Wegerich. Schweiz, Ober-Baiern und Tirol, Wiesen, 1500-2000 M., Juni, Juli.



Plantago montana Lam. — Berg-Wegerich. Alpenkette, Wiesen, 1200-1900 M., auf Kalk, Juli, August.





Rumex alpinus L. — Alpen-Ampfer. Alpenkette, Sennhütten, 1200—1800 M., Juli—September.






Rumex scutatus L. — Schild-Ampfer. Alpenkette, trockene Stellen, bis 2000 M., auf Kalk, Juli, August





Rumex nivalis Hegetschw. — Schnee-Ampfer. Schweiz bis Krain, trockene Stellen, 1900 - 2000 M., auf Kalk, Juli, August.






Oxyria digyna (L.) Campd. — Zweinarbiger Säuerling. Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900-2500 M., Juni-August.





Polygonum viviparum L. — Knospentreibender Knöterich.
Alpenkette, Wiesen, 1600-2100 M. Juni-August.





Daphne petraea Leyb. — Felsen-Seidelbast. Gelände der Südalpen Tirols, 1000-1700 M. Juni, Juli.

\$ 7 ž



Daphne striata Tratt. — Gestreifter Seidelbast. Schweiz bis Salzburg, trockene Stellen, 1700-2300 M. auf Kalk. Juni-August.

.




Daphne Blagayana Freyer. — Blagay's Seidelbast. Krajo and Stelermark, im Gebüsch, bis 1500 M. Mai-Juni.

·



Thesium alpinum L. — Alpen-Leinblatt. Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1500—2200 M., Juli, August.





Empetium nigrum L. — Schwarze Rauschbeere.

Alpenkette, auf Triften, 1700—2000 M. Mai, Juni.





Salix Waldsteiniana Willd. = arbusc. var. α Koch — Waldstein's Weide.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300-1900 M., auf Kalk, Juni, Juli.





Salix Myrsinites L. — Myrsinen-Weide.

Alpenkette, feuchte Stellen, Wiesen, 1300-2000 M., auf Urgestein, Juni, Juli.



Salix Helvetica Vill. = Lapponum Koch et aut. nec L. Schweizerische Weide.
Alpenkette, feuchte Stellen, 1500-2100 M., auf Urgestein, Juni, Juli.





Salix reticulata L. — Netzblättrige Weide. Alpenkette, trockene Stellen, 1600—2000 M. auf Kalk Juli, August





Salix herbacea L. — Krautartige Weide. Alpenkette, feuchte Stellen, 1900 2500 M., Juli, August.





Salix retusa L. -- Stumpfblättrige Weide. Alpenkette, trockene Stellen, 1600-2000 M., auf Kalk. Juli, August,





Alnus viridis Chaix) de Cand. -- Grüne Erle. Alpenkette, Was : und trockene Stellen, 900-2000 M. Mai, Jum





Juniperus Sabina L. — Stinkender Wachholder, Sadebaum Wallis bis Kram, stellenweise, 974—2340 M. April, Mai.






Juniperus nana L. — Zwerg-Wachholder Alpenkette, auf Kalkfeisen, 1000-2000 M. Mai-Juli.





Alpenkette, östl. Schweiz bis Oesterreich und Krain, Wiesen, 670-2000 M Juni, Juli.





Orchis globosa (L.) — Kugelähriges Knabenkraut.
Alpenkette, Wiesen, 1200—2000 M. Juni-Juli.






Orchis Spitzelii Saut — Spitzel's Knubenkraut. Tirol und Salzburg, auf Kalkboder bis 160 M Juni-Juni






Coeloglossum albidum (L.) Hartm. — Weissliche Hohlzunge.

Alpenkette, bis 1700 M. Juni-Juli.





Gymnadenia conopea (L.) R. Brown. — Fliegenblüthige Höswurz
Alpenkette, auf Wiesen, bis 1600 M. Jugi-Juli.





Cymnadenia odoratissima (L.) Rich. — Wohlriechende Höswurz.

Alpenkette, Wiesen, bis 1600 M., auf Kalk, Juli-August.





Coelogiossum viride (L.) Hartm. — Grüne Hohlzunge.

Alpenkette, auf Weiden, bis 1700 M. Mai - Juli.





Nigritella nigra (L.) Reichenb. fil. = angustifolia Rich. - Schwarz-blüthiger Schwarzständel, B-unelle.

Alpenkette, auf Kalkboden, 1200-2000 M. Mui-August






Changaeore, is the for Governor and the second of the seco





Epipactis rubiginosa (Gaud. var.) — Dunkelrothe Sumpfwurz. Alpenkette, bis 1800 M. Juni-Juli.





Listera cordifolia (L.) RBr. — Herzblättrige Listere, Zweiblatt.

Alpenkette, Gebüsch, 1000-1800 M., Juni, Juli.





Cypripedium Calceolus L. — Echter Frauenschuh.

Alpenkette, im Gebüsch, bis 2.000 M. Mai-Juni.





Crocus albiflorus Waldst. & Kitt. - vernus aut nec L - Weiss-, blühender Safran

Nördliche Kalk- und Centralalpen, bis 2000 M. April, Mai.





Streptopus amplexitolius (L.) Cand. - Stangelurnassende Knetenfuss.


Alpenkette, im Geba, ch. bis  $\gamma = \phi + \phi + g$  of





Lilium Martagon L. — Kruil-Lilie Alpenkeite Wiesen, lis 100 M. bes and Kais Juni-Aug





Lloydia serotina (L.) Salisb. — Spätblühende Lloydie, Alpenlilie.

Alpenkette, auf steinigen Triften, 1900—2600 M. Juni—August.





Pay aromen (Dens can)s T. - Gernelme! Fluoristalm.
Site a que en select of the Monte Con.






Paradisia Liliastrum (L.) Bertol. — Grosse Trichterlilie. Schweiz bis Krain, Wiesen, 1200–2000 M. Juni-Juli.







Auf Alpentriften, bes. um Alpenhitten, Schweiz bis Kainten, 1200 - 1900 M. Mai -Juni






Allium victoriale L. — Siegwurz-Lauch. Alpenkette, trockene Stellen, 1550-1900 M., bes. auf Kalk, Juli, August.





Allium foliosum Clar. = Schoenoprasum L. var. β alpinum Koch = sibiricum aut. nec L. — Blatt-Lauch.

Alpenkette, feuchte Stellen, Wiesen, 1200—1700 M., Juli, August.





Allium ericetorum Thore. — Hain-Lauch. Südl. Tirol und Kärnten, trockene Stellen, Wiesen, bis 1600 M., Juli, August





Veratrum Lobelianum Bernh. = album L. var  $\beta$  aut pl. — Lobel's Germer

Alpenkette auf Triften 630-1600 M Juli, August






Tofieldia palustris Huds. (1778) — borealis Wahlenb. (1812) — Sumpf-Tofieldie, Simsenlihe.

Alpenkette, auf Schneefelder, 1900-2700 M. Mai-October.





Juncus arcticus Willd. — Arktische Simse. Schweiz und Südtirol, feuchte Stellen, 1900—2500 M., auf Glimmerschiefer, Juni, Juli.






Juncus triglumis L. — Dreispelzige Simse. Alpenkette, auf Moorgründen, 1550—1900 M. Juli, August.





Juncus alpinus Vill. — Alpen-Simse. Alpenkette, Wiesen, feuchte Stellen, 1200–1900 M., Juli, August.





Juncus Jacquini L. — Jaquin's Simse. Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1560-2220 M., Juni, Juli.






Luzula spadicea (All.) de Cand. — Schwarzbraune Hainsimse. Centralalpenkette, Wiesen, 1600–2200 M., auf Urgestein, Juni, Juli.





Luzula lutea (All.) Caud. — Gelbe Hainsimse. Schweiz und Siidtirol, auf Alpenweiden 1200-2000 M. Juni-Juli.





Luzula spicata (L.) de Cand. — Achrige Hainsimse.


Alpenkette, trockene Stellen, 1530-2550 M., Juni-August.





Eriophorum Scheuchzeri Hoppe = capitatum Host. 1801. - Scheuchzer's Wollgras.


Alpenkette, feuchte Stellen, 1600-2000 M., besonders auf Urgestein, Mai-Juni,






Elyna spicata Schrad. — Aehrige Hüllsegge Alpenkette (Schweiz bis Steiermark), 1900—2500 M. Juni, Juli





Kobresia caricina Willd. — Riedgrasartige Kobresie. Jochsegge Alpenkette (Schweiz bis Steiermark), 1900—2500 M. Juli, August





Carex curvula All. — Gekrümmte Segge. Alpenkette, feuchte Stellen, 1900–2500 M., Juli, August.





Carex leporina L. — Hasen-Segge. Alpenkette, Wiesen. bis 1900 M. Juni, Juli.





Carex atrata L. — Schwarze Segge. Alpenkette, Wiesen, 1300—2000 M., Juli, August.



Carex firma Host. — Feste Segge.

Alpenkette, trockene Stellen, 1300—1900 M., besonders auf Kalk. Juni-Juli.





Carex capillaris L. — Haarförmige Segge. Alpenkette, feuchte Stellen, Wiesen, 1900—2200 M., Juni, Juli.





Carex sempervirens Vill. — Immergrüne Segge. Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1200-1900 M., Juni-August.






Phleum alpinum L. — Alpen-Lieschgras.

Alpenkette, Wiesen, 1300—1900 M., Juni—August.





Agrostis alpina Scop. — Alpen-Straussgras.

Alpenkette, trockene Stellen, 1900—2300 M., bes. auf Kalk. Juli, August.






Calamagrostis tenella Host. — Hartes Reitgras.
Alpenkette, trockene Stellen, 1300-1900 M., Juni-August.

infl





Sesleria disticha (Wulf.) Pers. — Zweizeilige Seslerie, Kopfgras. Schweiz, Baiern bis Kärnten, trockene Stellen, 1900-2500 M., bes. auf Urgestein. Juli, August.





Sesleria ovata (Hoppe 1799) Kern. = microcephala Koch nec Hoffm. et aut. = tenella Host 1802. — Eiförmige Seslerie, Kopfgras.

Tirol bis Kärnten und Niederösterreich, trockene Stellen, 1900-2800 M., bes. auf Kalk, Juli, August.






Sesieria coerulea (L.) Ard. — Blaue Seslerie, Kopfgras.
Alpenkette, trockene Stellen, bis 1800 M., bes. auf Kalk. Juni, Juli.





Köleria hirsuta (Schleich.) Gaud. — Rauhhaarige Kölerie, Schillergras. Schweiz, Tirol und Kärnten, Juli, August.





Avena Scheuchzeri All. = versicolor Vill. 1787 — Scheuchzer's Hafer.

Alpenkette, Wiesen, 1600-2500 Meter, bes. auf Schiefer, Juli, August.





Avena subspicata (L.) Clairv. — Aehrenrispiger Hafer. Schweiz bis Steiermark, trockene Stellen, 1900—2500 M., auf Schiefergestein, Juli, August.





Poa alpina L. — Alpen-Rispengras. Alpenkette. Wiesen, 1000-2100 M., Juni-August.





Poa distichophylla Gaud. = Cenisia Koch nec All. Zweizeiliges Rispengras.
Alpenkette, trockene Stellen, 1200-1900 M., bes auf Kalk.






Festuca Gaudini Kunth. = Halleri Koch et aut. nec All. -Gaudin's Schwingel.


Schweiz, Baiern und Tirol, trockene Stellen, 1900 - 2500 M., auf Schiefergestein, Juli, August.






Festuca pumila Chaix. — Niedriger Schwingel. Schweiz bis Kärlten, trockene Stellen, 1600-2200 M., bes. auf Kalk, Juli, August.






Nardus stricta L. — Aufrechtes Borstengras. Alpenkette, Wiesen, trockene Stellen, bis 1900 M., Juni, Juli.






Lycopodium Selago L. — Tannen-Bärlapp.

Alpenkette, auf Triften, 600-1600 M. Juli, August






Lycopodium alpinum L. — Alpen-Bärlapp. Alpenkette, 1300-2100 M. August, September.





Selaginella selaginoides (L.) = spinulosa A. Br. — Tannenbärlappartige Selaginelle, Moosfarren. Alpenkette, feuchte Stellen, bis 1800 M. Juni-August.





Botrychium Lunaria L. — Gemeine Mondraute. Alpenkette, Wiesen, bis 2000 M., besonders auf Kalk, Juni-August.





Woodsia hyperborea (Sw.) R. Brown. — Nordische Woodsie, Steinfarren.


Schweiz bis Salzburg u. Kärnten, trockene Stellen, 1500-2200 M. auf Schieferboden, Juli, August.






Aspidium Lonchitis (L.) Swartz. — Sichelfiedriger Schildfarn Alpenkette, auf Gerolle, 950-1600 M. August, September.





Cystopteris alpina (Wulf.) Linke = regia Bresl. var. β - Alpen-Blasenfarren.

Alpenkette, trockene Stellen, 1600-2100 M., bes. auf Kalk, Juli, August.









Schmendrich volg volkningsfilligen volg von der Germanne Historianse.

Als von der volkning v





Allosurus crispus (L.) Bernh. — Krausblättriger Rollfarren. Centralalpenkette, Wiesen, trockene Stellen, 1600—2200 M., Juli—September.







